

Що вам потрібно знати

про ваші ліки від латентної туберкульозної (ТБ) інфекції

ІЗОНІАЗИД І РИФАПЕНТИН

Вам дали ліки для лікування латентної туберкульозної інфекції. У вас немає туберкульозу і ви не можете передати туберкульоз іншим людям. Ці ліки призначені для **ЗАПОБІГАННЯ** захворюванню на туберкульоз.

Під час прийому цих ліків:

- ✓ Повідомте свого лікаря або медсестру, якщо у вас є питання або побоювання з приводу ліків.
- ✓ Ходіть на щотижневі прийоми до лікаря.
- ✓ Обговоріть питання споживання алкоголю зі своїм лікарем чи медсестрою. Під час прийому цих ліків краще не вживати алкоголь.
- ✓ Розкажіть своєму лікарю або медсестрі про всі інші ліки, які ви приймаєте.
- ✓ Обов'язково повідомте інших лікарів, що ви лікуєтеся від латентної туберкульозної інфекції.
- ✓ Деякі вважають, що краще вживати ліки під час їжі.

Поради, які допоможуть вам приймати ліки:

- ✓ Приймайте ліки в один і той же час щодня.
- ✓ Встановіть нагадування на час, коли ви повинні прийняти ліки.
- ✓ Попросіть члена сім'ї або друга нагадувати вам про прийом ліків.
- ✓ Використовуйте контейнер для таблеток.
- ✓ Помістіть записку з нагадуванням на дзеркало або холодильник.
- ✓ Використовуйте календар, щоб відзначити день, коли ви прийняли ліки.

Схема лікування латентної туберкульозної інфекції:

(Постачальники: вкажіть відповідний день і кількість таблеток)

Ліки	Розклад	Кількість таблеток на день	Тривалість
Ізоніазид і Ріфапентин	Щодня		3 місяці

Ваш лікар може порекомендувати вам приймати разом із ліками вітамін В6.

Примітки

Ім'я мого лікаря:

Назва моєї клініки:

Телефон моєї клініки:

За запитом цей документ може бути надісланий в альтернативному форматі для осіб з обмеженими можливостями або іншою мовою, для осіб з обмеженим знанням англійської. Щоб запросити цю публікацію в іншому форматі або іншою мовою, зв'яжіться з TB Control за номером 503-358-8516.



Звертайте увагу на ці можливі проблеми:

ПРИПИНІТЬ приймати ліки і негайно зателефонуйте своєму фтизіатру або медсестрі, якщо у вас виникнуть будь-які з наведених нижче проблем:

- Зниження або відсутність апетиту до їжі
- Розлад шлунка або шлункові спазми
- Лихоманка
- Болі у голові чи тілі
- Нудота чи блювота
- Сеча кольору коли або світлий стілець
- Легке утворення синців або кровотеч
- Висип або свербіння
- Пожовтіння шкіри чи очей
- Сильна слабкість чи втома
- Поколювання чи оніміння в руках чи ногах
- Запаморочення

ПРИМІТКА: Це нормально, якщо ваша сеча, слина чи слюзи стають оранжевими. М'які контактні лінзи можуть забарвитися.

Oregon
Health
Authority

ВІДДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Перетворення системи охорони здоров'я

ОНА 3711 (08/2021)
Ukrainian